

Batalla contra el mosquito en #Camaguey

- Última actualización: Miércoles, 25 Septiembre 2019 20:47

Publicado: Miércoles, 25 Septiembre 2019 20:47

Escrito por Jorge Hernández Madruga

Visto: 50

La [#OfensivaVsMosquito](#) Aedes Aegypti en el Policlínico “Rodolfo Ramírez Esquivel” de este municipio de [#Camagüey](#) se evidencia en el chequeo de la brigada para el tratamiento adulticida. [#NoAlMosquito](#)



Cómo combatir al mosquito *Aedes aegypti*

Los mosquitos *Aedes aegypti* solo pican durante el día, y son solo las hembras ya que necesitan consumir sangre para desarrollar los huevos.

La larva se desarrolla y crece en el agua hasta que se convierte en pupa y luego emerge el adulto.

El mosquito *Aedes aegypti* transmite el virus del Dengue, fiebre Chikungunya y el Zika.

Se encuentra en todo el territorio nacional, excepto en zonas altas y montañosas.

Los huevos del mosquito son depositados en el agua.



Cambiar periódicamente el agua de floreros y otros recipientes que requieren agua.



Mantener los techos y las canoas limpias.



Tapar los recipientes que contienen agua.



Eliminar llantas, baldes y recipientes en desuso.



Limpiar las paredes de fregaderos, pilas y espacios que se mantienen húmedos.



Evitar el uso de insecticidas, para prevenir el desarrollo de resistencia en los mosquitos.

Batalla contra el mosquito en #Camaguey


- Última actualización: Miércoles, 25 Septiembre 2019 20:47

Publicado: Miércoles, 25 Septiembre 2019 20:47

Escrito por Jorge Hernández Madruga



Visto: 50



 **bmn**
BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL

ZIKA

1. El Zika se diagnostica dentro de los primeros cinco días.
2. Tras la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días.
3. Uno de los síntomas que ayuda a identificar fácilmente este virus es la coloración roja en los ojos, debido a la conjuntivitis que produce
4. Cuadro clínico se asemejaría a un dengue leve.
5. Exantema macular o papular.
6. Fiebre
7. Artritis o artralgia
8. Hiperemia conjuntival
9. Mialgias
10. Cefalea
11. Anorexia
12. Desórdenes digestivos
13. Diarrea.
14. Dolor retroocular
15. Se puede presentar la inflamación en los miembros inferiores



DIFERENCIAS

DENGUE

1. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue (DENV).
2. La fiebre del dengue se inicia con una fiebre alta y repentina, de 4 a 7 días después de la infección
3. De 2 a 5 días después que la fiebre comienza, puede aparecer una erupción plana y roja sobre casi todo el cuerpo.
4. Posteriormente en la enfermedad, se presenta una segunda erupción.
5. Fatiga, Dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos)
6. Dolores articulares
7. Dolores musculares
8. Náuseas
9. Inflamación de los ganglios linfáticos
10. Vómitos, Tos, Dolor de garganta, Congestión nasal.
11. Después del quinto día de iniciados los síntomas se puede identificar mediante pruebas de laboratorio el dengue.